

CLASSIFICATION	CANNABINOÏDES	COCAÏNE	DÉPRESSEURS TRANQUILLISANTS SOMNIFÈRES <i>Opiacés</i> (héroïne, morphine, codéine, hydromorphone, oxycodone)
APPELLATION COMMUNE	Bat, Joint, Huile, H., Merde, Pétards, Pot, Hasch, Mari, Marijana, Ganja	Blow, C, Coke, Crack, Cristal, Dust, Dynamite, Flake, Gold dust, Heaven dust, Lady, Neige, Nose, Nose candy, Rock, Snow, Speedball = cocaïne + héroïne Toot, White	Héroïne : Bomb, Brother, Brown, Cat, Cheval, Chinese white, Dogie, Duji, Duster (cigarette), H, H and stuff, Horse, Junk, Juice dillies, Mack, Mexican mud, Queue de dragon, Scat, School boy, skag, Smack, snow, stuff, Tango and cash, White lady Autres Opiacés : Black, Blue velvet, Dollies, M. Methadone, Microdots, Miss Emma, Morphy, O, Pellets, Pg or PO, Pinks and grays, Poppy, Tar, Terp, T's and blues
MARQUES DE COMMERCE	Marinol (dronabinol)	Aucune	Codéine, Darvon, Démerol, Dilaudid, Talwin, Duramorph, Duragesi, Fiorinal-C, Innovar, Lorphane, Numorphan, Paracodin, Percocet, Percodan, Percodum, Sublimaze, Sulfate, 222, Traininic, Tussionex, Tylenol #1, #2, #3, #4
EFFETS CLINIQUES	Augmentation de la tension artérielle et du débit cardiaque; bronchodilatation aiguë; crainte de la lumière; une chute de la pression intraoculaire peut affecter la vue; appétit démesuré; perte de coordination, bouche sèche. Sensation générale de bien-être; sentiment de détente, indifférence, hallucinations; paraît être sous l'effet de l'alcool; modification de la perception du temps et de l'espace, anxiété, panique, dépression, délire, flashbacks, paranoïa, psychose, discours décousu.	Stimulation du SNC et du système nerveux sympathique; accélération du rythme cardiaque; hausse de la tension artérielle; dilatation de la pupille; très grande excitation; difficulté à respirer, défaillances et crises cardiaques, perte de poids, accidents cérébro-vasculaires (ACV), convulsions, anesthésie, augmentation de la température, tremblements. Énergie, assurance, hallucinations paranoïaques; sentiment passager d'énergie, période d'excitation souvent suivie de périodes de dépression, somnolence et épuisement, de nervosité, d'anxiété et de besoins compulsifs de consommer, confusion, euphorie, irritabilité, panique, labilité émotionnelle.	Diminution du SNC; suppression de la sensation de douleur; étourdissements, sensation de calme, faiblesse, somnolence, nausées, vomissements, constipation, rougeur de la peau, respiration ralentie et faible, convulsion, coma, décès. « Rush » décrit comme un orgasme par les utilisateurs intraveineux, euphorie, effet analgésique, somnolence (nodding), sensation de calme, labilité émotionnelle, confusion, ralentissement moteur.
DESCRIPTION PHYSIQUE	Feuilles séchées et broyées (marijuana), Roulé en cigarettes (joints), morceaux de résine de couleurs variées (hachisch), liquide visqueux de couleur foncée (huile de hachisch)	Poudre blanche cristalline ayant un goût amer; la cocaïne sous forme de « crack » ou de roches sont des petits morceaux de couleur blanche à ocre.	Poudre blanche, brune ou noire, liquides, pilules, capsules, injections
EN GÉNÉRAL CE QUE L'ON TROUVE DANS L'URINE	8-β-11 dihydroxy-Δ ⁹ -THC 8-β-hydroxy-Δ ⁹ -THC 11-hydroxy-Δ ⁹ -THC 11-nor-Δ ⁹ -THC-9-acide carboxylique 11-nor-Δ ⁹ -THC-9-acide carboxylique	Cocaïne, benzoylecgonine, ecgonine, ecgonine méthyl ester	Morphine, morphine-3-glucuronide, codéine, hydrocodone, hydromorphone, levorphanol, oxycodone
MÉTHODES USUELLES D'ADMINISTRATION	Fumé Mangé	Reniflée Fumée Injectée	Fumé Avalé Injecté Reniflé (héroïne)
UTILITÉS MÉDICALES	Pour diminuer nausée, vomissements liés à la chimiothérapie chez certains patients cancéreux. Pour augmenter l'appétit chez certains patients atteints du SIDA.	Anesthésique local	Comme analgésique et antitussif (codéine) et traitement des diarrhées.
COMMENT S'EN APERCEVOIR	Yeux rouges; appétit démesuré surtout pour les sucreries; prononciation difficile.	Dilatation de la pupille; excitation inhabituelle; transpiration abondante; congestion nasale; insomnie.	Somnolence, calme inhabituel, nonchalance, pupilles très rétrécies, traces de piqûres multiples sur la peau.
TEMPS DE DÉPISTAGE	1 ou 2 joints: 2-3 jours; ingestion orale: 1-5 jours; fumeur modéré (4 fois/ semaine): 5 jours; gros fumeur (quotidien): 10 jours; fumeur invétéré (plus de 5 joints par jour): 14-18 jours; les fumeurs invétérés peuvent être dépistés jusqu'à 11 semaines dans certains cas.	1 à 3 jours et plus chez les utilisateurs chroniques ou de fortes doses.	Opium, morphine, codéine, héroïne, hydromorphone, mépéridine : 1-2 jours; méthadone : 5-10 jours; oxycodone : 8-24 heures.

CLASSIFICATION	STIMULANTS <i>Amphétamines/ Méthamphétamines</i>	HALLUCINOGENES <i>Phencyclidine</i>
APPELLATION COMMUNE	Adam, Amphetamines, Bennies, Blue angels, Blue Beauties, Chris, Christine, Christmas tree, Coast to coast, Copilot, Crisscross, Cristal, Crossroads, Doe, Double Cross, Ecstasy, Footballs, Green and clears, Greenies, Hearts, LA turnarounds, Lip poppers, Love pill, MDA, MDMA, Meth, Oranges, Peaches, Pep pills, Pinks, Pink and green, Roses, Speed Stimulant, Truck drivers, Turnarounds, Uppers, Ups, Wake-ups, Whites, XTC Yellow jackets	Acide, Angel, Angel dust, Aurora, Bust bee, Cheap cocaine, Cosmos, Criptal, Crystal, Dummy mist, Goon, Green, Guerrilla, Hog, Jet, K, Killer weed, LSD, Lovely, Mauve, Mist, Mumm dust, PCP, Peace pill, Purple Ermans, Rocket fuel, Sherms, Special L.A. coke, Superacid, Supercoke, Supergrass, Superjoint, T., Trangs, tranq, Whack
MARQUES DE COMMERCE	Benzédrine, Biphématine, Delcobase, Désoxyne, Dexédrine, Méthédrine, Obétrol, Ritalin, Preludin, Tenuate	Aucune
EFFETS CLINIQUES	Accélération du rythme cardiaque; hausse de la tension artérielle; des doses importantes provoquent une demande accrue en oxygène et des transpirations abondantes. Perte de poids; de fortes doses peuvent causer de la tachycardie, des palpitations et de l'arythmie. Fièvre, hypotension, tremblements, frissons, convulsions, coma, vomissements, bouche sèche. Sensation de bien-être; vivacité accrue et énergie, étourdissements, insomnie, comportement irrationnel et euphorie; psychose, paranoïa, hallucinations et violence. Être en manque peut causer de la dépression et une sensation de fatigue. Agitation, confusion, délire, nausée, vigilance, bonne humeur, confiance en soi, concentration améliorée diminution de l'appétit, maux de tête.	Hausse de la tension artérielle; mouvements involontaires des yeux; transpiration abondante; coma, hypertension, fièvre, rigidité, tremblements, nausées, spasmes, vomissements, hallucinations, convulsions. Altération importante de la perception, de l'humeur et de la pensée; abolition de la sensibilité à la douleur; euphorie, agressivité, sensation d'être en état d'ébriété. Dépression, hallucinations, psychose, anxiété, désorientation, manque de jugement, perte de mémoire.
DESCRIPTION PHYSIQUE	Poudres, cristaux, cubes, capsules ou pilules de grosseurs et couleurs variées	Pilules, capsules, poudres de couleurs variées
EN GÉNÉRAL CE QUE L'ON TROUVE DANS L'URINE	d-amphétamine, d 1-amphétamine, d-méthamphétamine MDA, MDMA, acide benzoïque, p-hydroxyamphétamine, 4-hydroxyméthamphétamine 4-hydroxyamphétamine	Phencyclidine, PCDE, 1-(4-hydroxypiperidino), phénylcyclohexane, PCM, PCPy, 4-phényl-4 piperidinocyclohexanol, TCM, TCP, TCPy
MÉTHODES USUELLES D'ADMINISTRATION	Avalé Injecté	Fumé Ingéré Injecté Reniflé
UTILITÉS MÉDICALES	Déficit de l'attention, hyperactivité, narcolepsie	Aucun Utilisé comme tranquillisant en médecine vétérinaire
COMMENT S'EN APERCEVOIR	Dilatation de la pupille; très grande excitation; transpiration abondante	Pupille normale ou légèrement rétrécie, tremblements, déformation de la réalité (bruits, couleurs)
TEMPS DE DÉPISTAGE	1 à 2 jours	8-14 jours, jusqu'à 30 jours chez les adeptes invétérés; la quantité dans l'urine peut varier selon le pH urinaire.

Plus de 100 centres de prélèvements au Québec, pour renseignements composer le :
514 866-6146 (Montréal) ou 1 800-463-7674 (extérieur de Montréal)

N.B. : Les drogues et médicaments décrits dans le tableau ci-dessus sont inclus dans le profil toxicologique V.

Révisé par CHABOT TARDIF Experts-conseils en élaboration de politique alcool, drogues et tabac. 514 844-8288